

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، میزان وعده بعدی دارو را دو برابر نکنید و دوز بعدی را در زمان مشخص خود مصرف کنید.
- دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا با فاصله از غذا، همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای این فراورده
- خونریزی فعال (از جمله خونریزی‌های گوارشی و یا زخم‌های گوارشی، خونریزی جمجمه و مغز)
- تومورهای بدخیم با ریسک خونریزی
- چنانچه اخیراً جراحی نخاع، مغز یا چشم انجام داده‌اید.
- آنوریسم وریدی و ناهنجاری‌های شریانی
- واریس مری
- اختلال کبدی شدید
- بیماری‌هایی که از دریچه مصنوعی قلب استفاده می‌کنند.

مصرف در دوران بارداری

Category B، مصرف این دارو ممکن است سبب افزایش خطر خونریزی در دوره بارداری یا به هنگام زایمان شود. اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید، پزشک را مطلع نمایید.

مصرف در دوران شیردهی

ترشح این فراورده در شیر مادر مشخص نیست. مصرف آپیکسابان در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. بهتر است از سایر فراورده‌های ضد انعقاد استفاده نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط

مصرف دارو در این افراد باید با احتیاط صورت گیرد:

- طی دوره درمان با آپیکسابان، بیهوشی نخاعی با احتمال تشکیل هماتوم نخاعی همراه است که خود موجب فلج دائمی می‌شود. در صورت بیهوشی نخاعی، کاتتر اپیدورال را تا ۲۴ ساعت پس از مصرف

اپینکسا® در دو قدرت اثر عرضه می‌گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۲.۵ میلی گرم آپیکسابان
- قرص روکش دار حاوی ۵ میلی گرم آپیکسابان

دسته دارویی

مهار کننده مستقیم فاکتور انعقادی Xa

موارد مصرف

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

- پیشگیری از ترومبوز وریدی (تشکیل لخته خون) پس از جراحی تعویض مفصل زانو و جراحی تعویض مفصل لگن

- درمان ترومبوز وریدی عمیق / درمان لخته خون در ریه‌ها

- پیشگیری از عود ترومبوز وریدی عمیق / جلوگیری از عود آمبولی ریوی

- پیشگیری از سکتة مغزی در فیبریلاسیون دهلیزی در افرادی که سابقه سکتة مغزی، حمله ایسکمیک گذرا، نارسایی قلبی علامتی، دیابت قندی، فشارخون بالا و سن ۷۵ سال و بالاتر دارند.

راهنمایی‌های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمائید.

- دارو را دو بار در روز در زمان معین مصرف کرده و هرگز مصرف دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید.

آپیکسابان جدا نکنید. دوز بعدی آپیکسابان نیز نباید زودتر از ۵ ساعت پس از جدا کردن کاتتر مصرف شود. در صورت بروز تروما دوز بعدی نباید تا ۴۸ ساعت مصرف شود و علائم نورولوژیکی باید کنترل شود.

- توقف مصرف آپیکسابان باعث افزایش ریسک اتفاقات ترومبوتیک می شود. در صورت توقف مصرف این فراورده به جز به دلیل خونریزی و اتمام دوره درمان، حتماً فراورده ضد انعقاد دیگری را با نظر پزشک جایگزین نمایید.

- در بیماران با اختلالات کبدی کم تا متوسط مصرف این فراورده باید با احتیاط صورت گیرد و در بیماران با اختلال کبدی شدید، مصرف دارو مجاز نمی باشد. - در صورتی که کلیرانس کراتینین کمتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه باشد از مصرف این دارو خودداری شود و در مقادیر ۱۵-۲۹ میلی لیتر در دقیقه با احتیاط مصرف شود.

- همواره علائم خونریزی یا کم خونی در طی مصرف این دارو باید کنترل شود. در صورت بروز خونریزی شدید، درمان باید متوقف شود. بیماران باید از علائم و نشانه های از دست دادن خون آگاه باشند و باید به سرعت چنین وضعیتی را به پزشک یا اورژانس گزارش دهند.

- این دارو نباید به عنوان جایگزین هپارین در آمبولی ریوی مصرف شود.

- به علت وجود احتمال خونریزی در عمل جراحی، مصرف این دارو باید ۴۸-۲۴ ساعت قبل از عمل قطع شود.

- مصرف دارو در افراد با سن کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی گردد.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

- ضد پلاکت ها از جمله مهار کننده های P2Y12، NSAID ها، SSRI ها، ضد انعقادها از جمله آسپرین، هپارین.

- اپریتانت، بوسنتان، کولاژناز (سیستمی)، مهار کننده ها و القا کننده های CYP3A4، دابیگاتران، اتکسیلات، ریواروکسابان، کلاریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول، ریتوناویر، داساتینیب، دفرازیروکس، مشتقات استروژن، ایبریتوماب، ناپروکسن، فوزیدیک اسید (سیستمی)، اسید چرب امگا ۳، سالیسیلات ها، ویتامین E، گیاه علف چای و گیاهان دارویی ضد انعقاد و ضد پلاکت مانند یونجه، بادیان رومی، سیاه گیل. - مصرف گریپ فروت در طی دوره درمان با آپیکسابان می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد. بنابراین بهتر است با احتیاط مصرف شود.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف همزمان آن با این دارو نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- در پیشگیری از ترومبوز وریدی (تشکیل لخته خون) پس از جراحی تعویض مفصل زانو و یا جراحی تعویض مفصل لگن: ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز که باید ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از جراحی شروع شود، طول مدت درمان توسط پزشک تعیین می گردد.

- درمان ترومبوز وریدی عمیق/درمان لخته خون در ریه ها و پیشگیری از عود ترومبوز وریدی عمیق/جلوگیری از عود آمبولی ریوی: ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز، زمان شروع دارو و طول مدت درمان توسط پزشک تعیین می گردد.

- پیشگیری از سکتة مغزی در فیبریلاسیون دهلیزی در افرادی که سابقه سکتة مغزی، حمله ایسکمیک گذرا، نارسایی قلبی علامتی، دیابت قندی، فشارخون بالا و سن ۷۵ سال و بالاتر: ۵ میلی گرم دو بار در روز. این دوز به ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز کاهش می یابد،

در صورتیکه حداقل دو مورد از علائم زیر در بیمار دیده شود:

• سن بیمار ۸۰ سال یا بیشتر باشد.

• وزن بیمار ۶۰ کیلو یا کمتر باشد.

• سطح کراتینین در خون ۱۳۳ میکرومول در لیتر و بالاتر باشد.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده ممکن است دچار خونریزی شدید شوید. بلافاصله با پزشک تماس بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید. جعبه دارو را همراه خود نگهدارید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

* **اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است.** بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

کم خونی، خونریزی های وسیع و غیر وسیع، خونریزی در سیستم اعصاب مرکزی، خونریزی بینی، خونریزی های گوارشی، تهوع، واکنش های پوستی مانند راش پوستی، ترشح از زخم ها، ترومبوسیتوپنی، افت فشار خون، سنکوپ، اختلال در نتایج آزمایشات کبدی