بریلپتو®
بریواراستام

قرص بریلپتو® در دو قدرت اثر عرضه میگردد:
- قرص روکش دار حاوی ۵۰ میلی‌گرم بریواراستام
- قرص روکش دار حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم بریواراستام

دسته دارویی
داروهای مغز و اعصاب/ضد صرع

موارد مصرف
- این دارو جهت درمان صرع کانونی (پارشیال) با یا بدون گسترش ثانویه در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان از ۲ سال به بالا استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر نداده و یا مصرف دارو را قطع نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک یا چند وعده از دارو، به محض یادآوری، یک وعده دارو را مصرف و وعده‌ی بعدی را در زمان مقرر قبلی، مصرف کنید. به هیچ عنوان دو دوز را هم زمان با هم مصرف نکنید.
- استفاده از این فراورده ممکن است به علت تاثیر بر سیستم عصبی، سبب بروز خواب آلودگی و خستگی شود. در طی مصرف این دارو و به خصوص در اوایل دوره مصرف، هنگام رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت دارند احتیاط نمایید.

موارد منع مصرف
- در صورت حساسیت به بریواراستام یا دیگر ترکیبات مشابه مانند لوتیراستام یا پیراستام یا هر یک از اجزای دارو از مصرف این دارو خودداری کنید.
- در صورتی که سابقه‌ی بروز بثورات شدید پوستی، تاول، پوسته‌ریزی یا زخم دهانی و به صورت کلی، حساسیت پس از مصرف بریواراستام دارید، از مصرف این دارو خودداری کنید. در صورت عدم اطمینان، پیش از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری
مطالعات مربوط به مصرف در دوران بارداری کافی نبوده و مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

مصرف در دوران شیردهی
باتوجه به ترشح دارو در شیر مادر و کافی نبودن مطالعات موجود جهت ارزیابی تاثیر دارو بر شیرخواران، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها و موارد احتیاط
- این دارو نیز مانند سایر داروهای ضدصرع، ممکن است باعث افزایش خطر افکار و رفتارهای خودکشی شود. در صورت مشاهده هرگونه تغییرات غیرمعمول در رفتار یا خلق، به پزشک اطلاع دهید.
- در حین مصرف این دارو واکنش‌های رفتاری از جمله بروز علائم تحریک‌پذیری، افسردگی، رفتار پرخاشگرانه و اضطراب ممکن است رخ دهد. توصیه می‌شود بیماران از نظر بروز این علائم به‌دقت تحت نظر باشند.
- در صورت بروز واکنش های حساسیتی به این دارو، ممکن است علائم تنگی نفس، ورم صورت یا گلو و راش های پوستی مشاهده شود. در صورت مشاهده این علائم، فوراً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید. مصرف دوباره دارو مجاز نیست.
- همانند اکثر داروهای ضد صرع، قطع ناگهانی مصرف دارو ممکن است باعث افزایش تعداد حملات تشنجی شود؛ کاهش دوز باید به‌صورت تدریجی و تحت نظر پزشک انجام شود.

- مصرف همزمان الکل و بریواراستام توصیه نمی شود. در صورت مصرف همزمان، امکان افزایش عوارض منفی الکل وجود دارد.
- در صورت داشتن مشکلات کبدی، پزشک ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو داشته باشد؛ حتماً پزشک خود را مطلع کنید.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها قبل از مصرف این دارو حتماً پزشک خود را مطلع نمایید. این فراورده با داروهای زیر تداخل اثر دارد:

- مصرف همزمان این دارو با داروی Rifampin، به دلیل کاهش دوز موثر بریواراستام نیازمند افزایش دوز مصرفی داروی بریواراستام خواهد بود.
- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد صرع (از جمله Phenytoin، Carbamazepine، ...) نیازمند تعدیل دوز داروها می باشد.
- مصرف هم زمان این دارو و داروی Levetiracetam، به علت شباهت مکانیسم عملکرد دارای ارزش افزوده‌ای نمی باشد و توصیه نمی‌شود.

توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فراورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می‌تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک بر اساس نیاز بیمار تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- بزرگسالان (بالای ۱۶ سال یا وزن ۵۰ کیلوگرم و بالاتر): دوز پیشنهادی از ۲۵ میلی‌گرم تا ۱۰۰ میلی‌گرم دوبار در روز به تنهایی یا همراه با سایر داروها می‌باشد. در ادامه پزشک در مورد دوز مناسب تصمیم گیری خواهد کرد.
- کودکان و نوجوانان : تنظیم دوز و رژیم دارویی براساس وزن بدن و با صلاحدید پزشک معالج انجام می‌شود.

* قرص را به صورت کامل و خرد نشده، همراه با غذا و یا با فاصله از غذا همراه با یک لیوان آب مصرف کنید.
* در بیماران با نارسایی کبدی، تنظیم دوز دارو، توسط پزشک معالج انجام می گیرد.
* مطالعات این دارو جهت مصرف در نوزادان زیر ۱ ماه، کافی نمی‌باشد.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض این دارو شامل خواب‌آلودگی، سرگیجه، اضطراب، افسردگی، خستگی، بی خوابی (مشکل در به خواب رفتن)، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، یبوست، سرفه و افزایش ریسک بیماری‌های عفونی و علائم شبه سرماخوردگی هستند.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

***اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.**

دارنده پروانه ساخت
شرکت دارو درمان پارس
ایران - تهران
Darou Darman Pars