



- این دارو را می‌توان همراه با غذا یا با فاصله از وعده غذایی مصرف نمود و بهتر هست در زمان‌های مشخص در روز دارو را میل نمایید.
- در صورت مشکل در بلع قرص، می‌توانید قرص را خرد کرده و همراه با آب میل نمایید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به هر یک از اجزای این دارو
- هرگونه سابقه خونریزی مغزی
- خونریزی فعال (از جمله خونریزی‌های گوارشی)
- سابقه اختلالات کبدی

مصرف در دوران بارداری

بدلیل عدم مطالعات کافی مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر مشخص نیست. مصرف تیکاگلولور در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها و موارد احتیاط

- این دارو باعث می‌شود که شما ساده‌تر از قبل دچار خونریزی شوید؛ این موضوع می‌تواند شدید بوده و حتی با خطر مرگ همراه باشد. بنابراین در هنگام انجام فعالیت‌هایی که خطر خونریزی یا آسیب دیدن را افزایش می‌دهند، مراقبت بیشتری انجام دهید.
- در صورت وقوع هرگونه خونریزی تا حد امکان، خونریزی را تحت نظر پزشک، بدون قطع مصرف این دارو کنترل نمایید.
- ممکن است شما دچار خونریزی داخلی (مثلاً در معده یا روده) شده باشید. اگر مدفوع به رنگ سیاه و یا مدفوع خونی، ادرار به رنگ قرمز یا صورتی، سرفه به همراه بالا آوردن خون و یا استفراغ به رنگ قهوه‌ای دارید، بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. چرا که ممکن است علائمی از خونریزی در دستگاه گوارش شما باشد.
- قبل از انجام جراحی یا کارهای دندانپزشکی، مصرف

قرص کاردلا® در دو قدرت اثر عرضه می‌گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۶۰ میلی گرم تیکاگلولور
- قرص روکش دار حاوی ۹۰ میلی گرم تیکاگلولور

دسته دارویی

مهارکننده تجمع پلاکتی - ضد انعقاد

موارد مصرف

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

داروی کاردلا® از چسبیدن پلاکت‌های خون به همدیگر و ایجاد لخته‌های خونی جلوگیری می‌کند. ایجاد شدن لخته‌های خون، می‌تواند منجر به بیماری‌های قلبی و مشکلات رگ‌های خونی گردد. این دارو، خطر سکته‌ی مغزی یا ایجاد مشکلات قلبی جدی بعد از سکته‌ی قلبی یا درد قفسه‌ی سینه‌ی شدید را در افراد کاهش می‌دهد.

راهنمایی‌های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمائید.

- دارو را مطابق تجویز پزشک معالج خود مصرف نموده و از قطع دارو، بدون نظر پزشک جدا خودداری نمایید. (قطع مصرف دارو ممکن است باعث افزایش خطر سکته‌ی قلبی یا مغزی شود)

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، میزان وعده بعدی دارو را دو برابر نکنید و دوز بعدی را در زمان تعیین شده قبلی مصرف کنید.

این دارو را به پزشک اطلاع دهید. ممکن است لازم باشد که مصرف این دارو را برای مدت کوتاهی تنها با نظر پزشک معالج قطع کنید. مصرف مجدد دارو در کوتاه ترین زمان بعد از عمل جراحی زیر نظر پزشک معالج شروع می شود.

- در صورت بروز علائم درد یا فشار در قفسه‌ی سینه، دردی که به سمت فک یا شانه‌ی شما امتداد یابد، حالت تهوع، عرق کردن (علائم سکته قلبی) و یا بی‌حسی یا ضعف ناگهانی (به خصوص در یک سمت بدن)، سردرد ناگهانی شدید، لکنت زبان، مشکلات بینایی یا مشکلات تعادلی (علائم سکته مغزی)، بلافاصله به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

- از این دارو بلافاصله بعد از جراحی بای پس قلب (پیوند عروق کرونر) استفاده نکنید.

- اختلالات تنفسی با مصرف این دارو مشاهده شده است. بنابراین مصرف این دارو در بیماران مبتلا به آسم یا با بیماری انسداد ریوی مزمن باید با احتیاط صورت گیرد. در صورت مشاهده هرگونه اختلال تنفسی به پزشک معالج اطلاع دهید.

- مصرف این دارو می تواند سبب بروز نتایج کاذب در برخی از آزمایشات خون شود، در صورت نیاز به انجام آزمایشات خونی، مصرف این دارو را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

- از مصرف الکل خودداری نمایید، چرا که می تواند باعث افزایش احتمال خونریزی در معده شود.

- این دارو جهت مصرف در بالغین بالای ۱۸ سال است.

تداخلات دارویی

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

- در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد پلاکت و همچنین داروهای ضد انعقاد (از جمله هپارین، وارفارین، داروهای فیبرینولیتیک و NSAID ها) خطر خونریزی افزایش می یابد.

- مصرف همزمان تیکاگرلور با مهارکننده‌های CYP3A4 (مانند کتوکونازول، کلریترومایسین، نفازودون، ریتوناویر و آتازاناویر) و سیکلوسپورین، اثر تیکاگرلور را به شدت افزایش می دهد.

- مصرف همزمان تیکاگرلور با القاکننده‌های CYP3A4 (مانند ریفامپیسین، کاربامازپین، فنی توئین، فنوباربیتال)، اثر تیکاگرلور را کاهش می دهد.

- مصرف همزمان با داروهای مخدر از جمله مورفین سبب کاهش اثر این دارو می گردد.

- مصرف همزمان تیکاگرلور با داروهای سیمواستاتین، آتروواستاتین و دیگوکسین، اثر آن‌ها را افزایش می دهد.

- مصرف همزمان تیکاگرلور با داروهای پروکستین، سرترالین و سیتالوپرام می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد.

- مصرف گریپ فروت به میزان زیاد می تواند اثر تیکاگرلور را افزایش دهد.

- این دارو همراه با آسپیرین تجویز می گردد ولیکن باید توجه داشت، مصرف آسپیرین با دوزهای بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در روز، اثر این دارو را کاهش می دهد.

- قبل از مصرف هر گونه داروی سرماخوردگی، آلرژی یا مسکن، از داروساز یا پزشک خود سوال کنید.

آسپیرین (که گاهی به صورت مخفف با ASA نیز نشان داده می شود)، در بسیاری از داروهای ترکیبی وجود دارد؛ اگر داروهای حاوی آسپیرین را به همراه هم استفاده کنید، باعث افزایش خطر ایجاد خونریزی در شما می شود. برای اطمینان از اینکه داروهایی که به همراه این دارو استفاده می نمایند، حاوی آسپیرین نیستند، روی جعبه آن‌ها را مطالعه کنید و از عدم وجود آسپیرین یا ASA مطمئن شوید.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات بمعنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف همزمان آن با این دارو نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

در آغاز درمان، مصرف دو قرص در یک زمان، تجویز می گردد و درمان با کاهش دوز مصرفی دارو، تحت نظر پزشک ادامه می یابد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

از عوارض شایع یا بسیار شایع این فراورده می توان تنگی نفس، اختلالات خونی و خونریزی در نواحی مختلف، یبوست، اسهال، سوء هاضمه، حالت تهوع، سرگیجه، گیجی، سردرد، راش پوستی، پورپورا (خونریزی زیر پوستی)، آرتریت نفرسی، افت فشار خون، افزایش سطح کراتینین خون، افزایش سطح اوره را نام برد.

مسمومیت

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، بلافاصله با پزشک تماس بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

*** اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.**

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران



Darou Darman Pars