

و خستگی شود. در صورت بروز چنین علائمی در هنگام رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت دارند احتیاط نمایید.

**انترسکور®**



ساکوبیتریل / والزارتان

### موارد منع مصرف

- سابقه حساسیت شدید به ساکوبیتریل ، والزارتان و یا هر یک از اجزای دارو
- در بیماران با سابقه بروز آنژیوادم و یا آنژیوادم وراثتی
- مصرف همزمان با مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( کاپتوپریل، انالاپریل، پریندوپریل، ... )
- و یا بلوکه کننده های گیرنده آنژیوتانسین (لوزارتان، تلمیزارتان، ...)
- نارسایی شدید کبدی

### مصرف در دوران بارداری

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

### مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

### هشدارها و موارد احتیاط

- مصرف این دارو می تواند سبب بروز آنژیوادم گردد. در صورت بروز علائمی مثل تورم گلو، لب ها، زبان و صورت، مصرف این فراورده را قطع نموده و به پزشک معالج اطلاع دهید.
- مصرف این فراورده موجب افت فشارخون به ویژه در افراد با فشار خون سیستولی پایین و افراد بالای ۶۵ سال می گردد. در صورت بیماری (اسهال / استفراغ)، قرار گرفتن در هوای بسیار گرم (تعریق زیاد) و هر عاملی که باعث از دست رفتن آب بدن و کاهش فشارخون می شود، احتیاط نمایید.
- مصرف این فراورده موجب کاهش عملکرد کلیه ها می گردد. بنابراین در افراد با سابقه اختلالات کلیوی در طول درمان، احتیاط و بررسی های لازم توسط پزشک معالج باید صورت گیرد.
- مصرف این فراورده موجب افزایش سطح پتاسیم می گردد. میزان پتاسیم به ویژه در بیماران با اختلالات

### انترسکور® در سه قدرت اثر عرضه می گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۲۴ میلی گرم ساکوبیتریل و ۲۶ میلی گرم والزارتان
- قرص روکش دار حاوی ۴۹ میلی گرم ساکوبیتریل و ۵۱ میلی گرم والزارتان
- قرص روکش دار حاوی ۹۷ میلی گرم ساکوبیتریل و ۱۰۳ میلی گرم والزارتان

### دسته دارویی

قلبی / عروقی

### موارد مصرف

این دارو از پیشرفت نارسایی قلبی جلوگیری کرده و ریسک بستری شدن و مرگ ناشی از نارسایی قلبی را کاهش می دهد.

### راهنمایی های عمومی

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
- دارو را می توانید همراه با غذا و یا با فاصله از غذا همراه با یک لیوان آب مصرف کنید.
- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر ندهد و یا مصرف دارو را قطع نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.
- مصرف این فراورده ممکن است سبب بروز سرگیجه

## مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

بزرگسالان: روزی دوبار هر بار یک قرص با کمترین دوز دارو که با نظر پزشک معالج بتدییج افزایش می یابد. کودکان: میزان مصرف دارو در کودکان بزرگتر از یکسال بر اساس وزن کودک و توسط پزشک معالج تعیین می گردد.

## عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

واکنش های حساسیتی شامل ورم لب و صورت، افزایش پتاسیم خون، افت قند خون، کم خونی، سرگیجه، سردرد، سنکوپ، افت فشار خون، افت فشارخون وضعیتی، سرفه، اسهال، حالت تهوع، خستگی و ضعف، اختلالات و نارسایی کلیوی،

## مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

## شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.  
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

\* **اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است.** بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

کلیوی و دیابتی باید بررسی شده و در صورت نیاز دوز دارو کاهش یابد. از مصرف مکمل های حاوی پتاسیم و یا جایگزین های نمک حاوی پتاسیم، بدون نظر پزشک معالج خودداری کنید. علائم افزایش سطح پتاسیم شامل: ضربان قلب پایین، نبض ضعیف، ضعف عضلانی می باشد.

- در بیماران با اختلالات کبدی و همچنین نارسایی کبدی مصرف این فرآورده باید با احتیاط صورت گیرد. مصرف این فرآورده در بیماران با نارسایی شدید کبدی ممنوع است.

- مصرف این فرآورده می تواند سبب بروز توهم، پارانوئا، اختلالات خواب گردد، در صورت هرگونه تغییر در شرایط روحی خود، به پزشک معالج اطلاع دهید.

## تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها قبل از مصرف این دارو حتماً پزشک خود را مطلع نمایید. این فرآورده با داروهای زیر تداخل اثر دارد:

- مصرف همزمان با مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (کاپتوپریل، انالاپریل، پریندوپریل، ...) و یا بلوکه کننده های گیرنده آنژیوتانسین (لوزارتان، تلمیزارتان، ...) ممنوع می باشد، در صورت نیاز به جایگزینی دارو با هریک از داروهای فوق، حداقل ۳۶ ساعت بین مصرف دو دارو باید فاصله باشد.

- داروهای حاوی Aliskiren، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک سدیم و ملوکسیکام، داروهای حاوی پتاسیم، تریامترن، اسپرونولاکتون، داروهای حاوی لیتیم، فورزماید، متفورمین، سیلدنافیل، داروهای خانواده استاتین مانند سیمواستاتین

توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران تهران

