

فلریتم®

تیکاگرویلور

فلریتم® در قدرت اثر زیر عرضه می گردد:

- قرص خط دار حاوی ۱۰۰ میلی گرم فلکائینید استات

دسته دارویی

آنتی آریتمی

موارد مصرف

در درمان و یا پیشگیری از موارد اختلالات شدید ریتم قلب از جمله درمان آریتمی بطنی یا فوق بطنی، پیشگیری از تاکیکاردی بطنی، درمان فیبریلاسیون و فلاتر دهلیزی.

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمائید.

- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید و بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر ندهید و یا مصرف دارو را قطع نکنید.

- دارو را با یک لیوان کامل آب مصرف نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آنرا میل کنید و اگر تقریباً زمان مصرف بعدی نزدیک شده، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.
- در رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط نمایید.

- در بیماران با تاکیکاردی بطنی طول کشیده و بیماری های قلبی زمینه ای جدی باید در بیمارستان و تحت نظر دارو را شروع کنند.

موارد منع مصرف

- سابقه حساسیت به دارو و یا اجزای آن ها.
- بیماری های ساختاری قلب (مانند نقص سپتوم دهلیزی یا بطنی، نقص دریچه های قلبی،...) و بیماری های ایسکمیک قلبی مانند سکته ی قلبی
- مصرف همزمان با ریتوناویر، فوزامپرنویر، پیموزاید و تیپراناویر
- بلوک درجه دو سه قلبی

مصرف در دوران بارداری

در افراد باردار در صورت تشخیص پزشک با حداقل دوز تجویز می شود. حتی الامکان در سه ماهه اول بارداری بهتر است از فلکائینید پرهیز شود. در مراکز تخصصی جهت کنترل آریتمی مادر و جنین استفاده می گردد (در اینصورت به دلیل احتمال بروز یرقان، کودک پس از تولد باید تحت نظر پزشک باشد).
مطالعات کامل و کنترل شده در مورد اثر این دارو در زنان باردار انجام نشده است.

مصرف در دوران شیردهی

دارو در شیر مادر ترشح می شود. لذا هنگام تجویز دارو منافع مصرف دارو برای مادر با مضرات احتمالی آن برای نوزاد، توسط پزشک معالج باید بررسی گردد.

هشدارها و موارد احتیاط

مصرف دارو در این افراد باید با احتیاط صورت گیرد:
- افراد سالخورده، زنان، بیماران با سابقه ی دیابت ملیتوس، تیروئید، سوء تغذیه، نارسایی کبدی، افزایش فشار خون، برادیکاردی، عدم توازن الکترولیت های خون (کاهش منیزیم، پتاسیم و یا کلسیم)، سابقه ی نارسایی احتقانی قلب، شوک کادیوژنیک، آریتمی بطنی از نوع TdP و افزایش فاصله QT (Torsade de point & QT Prolongation)
فیبریلاسیون دهلیزی مزمن، آریتمی بطنی بدن علامت در افراد با سکته ی قلبی اخیر
- در بیماران دارای پیس میکر (pace maker) و یا مبتلا به نارسایی کبدی و یا کلیوی، کاهش دوز دارو و پایش

متناوب بیمار در شروع دارو، یک هفته بعد و سپس بفواصل منظم طبق نظر پزشک توصیه می‌گردد.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

فلکاینید با داروهای زیر تداخل اثر دارد:

آمیودارون، دومپریدون، دیگوکسین، پروپرانولول، آتنولول، تیمولول، متوپرولول، وراپامیل، آمیودارون، دیلتیازم، نیفدپین، سایمتیدین، داروهای ضد افسردگی (فلوکستین، پاروکستین)، بوپروپیون، تربینافین، ریتوناویر، دیورتیک‌ها، آنتی هیستامین (ترفنادین)، فنی توین، کلوزاپین، کاربامازپین و فنوباربیتال.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی‌شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف همزمان آن با فلکائینید نمی‌باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می‌تواند مانع تداخل گردد.

تداخلات غذایی

اگرچه مصرف شیر ممکن است در جذب کاهش ایجاد کند و حذف شیر از برنامه غذایی توصیه نمی‌شود ولی در صورت حذف ممکن است نیاز باشد، دوز دارو تغییر یابد.

غلظت دارو در خون بیماران با رژیم سخت گیاهخواری بواسطه تغییر اسیدیته ادرار افزایش می‌یابد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

بزرگسالان

۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم دو بار درروز، این میزان تحت نظر پزشک معالج قابل افزایش می باشد. حداکثر دوز مجاز ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلی گرم در روز است.

نوزادان/کودکان

مقدار مورد نیاز توسط پزشک معالج براساس وزن بیمار تعیین می‌گردد.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

اختلالات بینایی، اختلالات گوارشی، تنفسی، عصبی، پوستی، قلبی (آریتمی، تپش قلب، کاهش یا افزایش تعداد ضربان قلب)، لرزش، بی حسی اعضا، گیجی، سردرد و ضعف.

مسمومیت

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، بلافاصله با پزشک تماس بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

- در دمای ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- دارو را دور از دید و دسترسی کودکان قرار دهید.

***اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.**

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران

