



هر قرص روکش دار حاوی ۱۰ میلی گرم و یا ۲۰ میلی گرم فاینرنون می باشد.

دسته دارویی

داروهای قلبی / آنتاگونیست غیر استروئیدی گیرنده مینرالوکورتیکوئید

موارد مصرف

- این دارو در بزرگسالان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی همراه با دیابت نوع ۲، جهت کاهش پیشرفت بیماری کلیوی و بهبود و پیشگیری از عوارض قلبی، تجویز میگردد.

- همچنین با هدف کاهش خطراتی مانند مرگ به دلیل بیماری های قلبی، بستری شدن و یا ویزیت اورژانسی به دلیل نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می شود.

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک، میزان دوز مصرفی دارو را تغییر ندهید و یا آن را قطع نکنید. قطع دارو تنها در صورت توصیه پزشک پس از بررسی نتایج آزمایشات خونی انجام میشود.

- جهت حفظ اثر دارو قرص را هر روز در ساعت مشخصی مصرف کنید.

- دارو را می توانید با یک لیوان آب، همراه یا بدون غذا مصرف کنید.

- اگر در بلعیدن قرص مشکل دارید، می توانید آن را خرد کرده و با آب یا غذاهای نرم مخلوط و مصرف کنید.

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آنرا میل کنید و اگر تقریباً زمان مصرف بعدی نزدیک شده، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

• در صورت سابقه افزایش میزان پتاسیم خون • کاهش شدید عملکرد کلیه یا نارسایی کلیوی • مشکلات کبدی متوسط یا شدید • نارسایی قلبی خفیف، متوسط یا شدید

موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به فاینرنون و یا هریک از اجزای این دارو

- در صورت مصرف داروهای مهارکننده قوی CYP3A4، از جمله ایتراکونازول، کتوکونازول، ریتوناویر، نلفیناویر، کوپسیسیتات، کلاریترومایسین، تلیترومایسین، نفازودون و سایر داروهای مشابه، از مصرف کورنو خودداری فرمایید.

- در بیماری آدیسون و همچنین در افراد مبتلا به افزایش پتاسیم خون (Hyperkalemia)

- در صورت نارسایی شدید کبدی

مصرف در دوران بارداری

- مطالعات کافی جهت بررسی ایمنی این دارو در دوران بارداری انجام نشده است.

- در طول درمان با این دارو، سطح پتاسیم سرم به صورت دوره‌ای اندازه‌گیری گردیده و دوز دارو براساس آن تنظیم می‌شود.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها قبل از مصرف این دارو حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

- این فرآورده با داروهای زیر تداخل اثر دارد:

- آمیلوراید، تریامترن.
- سایر داروهای مشابه فاینرون مانند اپلرون و اسپیرینولاکتون
- تری متوپریم یا داروی ترکیبی تری متوپریم/سولفامتوکسازول.
- مکمل‌های حاوی پتاسیم.
- از مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده یا القاکننده قوی یا متوسط CYP3A4 اکیداً خودداری فرمایید. زیرا ممکن است سبب بروز عوارض جانبی بیشتر و یا کاهش اثر داروی فاینرون شوند. از جمله این داروهای می‌توان به اریترومیسین، وراپامیل، فلوواکسامین، ریفامپیسین، کاربامازپین، فنی‌توئین، فنوباربیتال، گیاه St. John's Wort یا علف چای و افایورنز اشاره کرد.
- اگر داروهای کاهنده فشار خون مصرف می‌کنید، ممکن است پزشک تصمیم بگیرد فشار خون شما را به‌طور منظم بررسی کند.
- در زمان مصرف این دارو از خوردن گریپ فروت یا نوشیدن آب آن خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث افزایش مقدار دارو در خون و بروز عوارض جانبی شود.

در نتیجه از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری فرمایید. مگر اینکه پزشک شما تشخیص دهد که فواید درمان بیشتر از خطرات احتمالی برای جنین است. همچنین در طول مدت درمان از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

مصرف در دوران شیردهی

- مطالعات کافی جهت بررسی ایمنی این دارو در دوران شیردهی انجام نشده است. از مصرف این دارو در دوران شیردهی خودداری کنید؛ زیرا ممکن است به نوزاد آسیب برساند.

هشدارها و موارد احتیاط

- به دلیل نبود مطالعات کافی درباره ایمنی و اثربخشی این دارو در افراد زیر ۱۸ سال، مصرف این دارو در این گروه سنی توصیه نمی‌شود.

- این دارو ممکن است سبب افزایش سطح پتاسیم خون (هایپرکالمی) شود.

خطر افزایش هایپرکالمی با کاهش عملکرد کلیه افزایش میابد. این افزایش در بیمارانی که سطح پتاسیم پایه بالایی دارند یا سایر عوامل خطر هایپرکالمی را دارند بیشتر است. بنابراین سطح پتاسیم سرم و نرخ تصفیه گلومرولی تخمینی (eGFR) در تمام بیماران باید پیش از شروع مصرف دارو اندازه‌گیری شود و دوز دارو بر مبنای آن تجویز گردد. اگر سطح پتاسیم سرم بیشتر از ۵ میلی‌اکی‌والان بر لیتر باشد، از مصرف دارو خودداری فرمایید.

- چهار هفته پس از شروع مصرف این دارو، ممکن است پزشک مجدداً آزمایشات خونی را تکرار و با توجه به وضعیت سطح پتاسیم خون و eGFR، دوز دارو را تغییر دهد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- عوارض بسیار شایع این دارو شامل افزایش سطح پتاسیم خون می باشد که با بروز علائمی چون ضعف و خستگی، بی حسی دست ها و لب، انقباض عضلانی و کاهش ضربان قلب همراه است.

- همچنین این دارو ممکن است سبب کاهش سطح سدیم خون شود که علائم آن شامل تهوع، خستگی، سردرد، گیجی، اسپاسم و یا انقباض عضلانی می باشد. از دیگر عوارض این دارو، می توان به کاهش نرخ فیلتراسیون گلومرولی، افزایش سطح اوریک اسید در خون، کاهش فشار خون و خارش پوستی اشاره کرد.

مسمومیت

- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

شرایط نگهداری

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس و دید کودکان قرار دهید.

دارنده پروانه ساخت
شرکت دارو درمان پارس
ایران - تهران



توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک بر اساس نیاز بیمار تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- پیش از شروع مصرف، سطح پتاسیم خون و نرخ فیلتراسیون گلومرولی تخمینی بیمار پایش گردد. در صورتی که سطح پتاسیم خون بالای ۵ میلی اکی والان بر لیتر می باشد، از مصرف دارو خودداری کنید.

دوز شروع پیشنهادی به شرح زیر است:

- برای بیمارانی با نرخ فیلتراسیون گلومرولی تخمینی (eGFR) بر حسب (ml/min/1.73 m^2) بالای ۶۰، دوز شروع پیشنهادی مصرف روزانه یک قرص ۲۰ میلی گرمی است.

- برای بیمارانی با eGFR بین ۲۵ تا ۶۰، دوز شروع پیشنهادی یک قرص ۱۰ میلی گرمی در روز است.
- در بیمارانی که eGFR آن ها کمتر از ۲۵ است، مصرف این دارو توصیه نمی شود.

❖ مهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.