



لینوسنزا® لیناگلیپتین

شود. در صورت داشتن علائمی مثل سرگیجه، لرزش، تعریق و تاری دید از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، خودداری کنید.

موارد منع مصرف

- حساسیت شدید به هر یک از اجزای این فراورده
- این دارو در دیابت نوع ۱ و کتواسیدوز دیابتی کارایی نداشته و مصرف آن مناسب نمی باشد.

مصرف در دوران بارداری

مطالعات کافی در زنان باردار انجام نشده است. مصرف دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در دوران شیردهی

با توجه به احتمال ترشح دارو در شیر مادر، تصمیم در مورد ادامه درمان با این دارو در دوران شیردهی با پزشک معالج می باشد.

هشدارها و موارد احتیاط

- با توجه به اینکه با مصرف این دارو، احتمال بروز پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) وجود دارد، در صورت بروز علائمی مانند دل درد و کمر درد شدید و مداوم همراه با تهوع و سرگیجه بلافاصله به پزشک معالج اطلاع دهی.
- در صورت سابقه نارسایی قلبی یا نارسایی کلیوی، پزشک را مطلع نمایید. علائمی مثل خستگی غیرعادی، افزایش ناگهانی وزن، مشکلات تنفسی (حتی هنگام استراحت) می توانند از عوارض نارسایی قلبی باشند.
- در صورت بروز واکنش های حساسیتی از جمله تورم گلو، لب ها و یا زبان، خس خس سینه و یا واکنش های حساسیتی پوست، مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک تماس بگیرید.
- در صورت ابتلا به درد مفاصل در طول دوره درمان با این دارو، پزشک را مطلع نمایید.
- در صورت بروز تاول یا هر ضایعه پوستی، پزشک را مطلع نمایید.

قرص لینوسنزا® در یک قدرت اثر عرضه می گردد:
- هر قرص روکش دار حاوی ۵ میلی گرم لیناگلیپتین

دسته دارویی

قلبی / عروقی

موارد مصرف

این دارو در دیابت نوع ۲، در کنار ورزش و رژیم غذایی و یا همراه با داروهای دیگر کاهش دهنده قند خون، مصرف می شود.

راهنمایی های عمومی

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر نداده و یا مصرف دارو را قطع نکنید.
- به دستورات پزشک در مورد ورزش و رعایت رژیم غذایی توجه کامل داشته باشید.
- دارو را می توانید همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن را میل کنید و اگر تقریباً زمان مصرف بعدی نزدیک شده، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.
- مصرف این دارو همراه با متفورمین، انسولین یا دیگر داروهای کاهش دهنده قند خون می تواند باعث کاهش بیش از حد سطح قند خون (هایپوگلیسمی)

- استفاده از این دارو همراه با انسولین و یا محرک‌های ترشح انسولین و یا هریک از داروهای کاهنده قند خون، ممکن است منجر به کاهش شدید قند خون (هایپوگلیسمی) شود. در مصرف همزمان داروها، تنظیم دوز دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد. در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، لرزش، رنگ پریدگی، تعریق و تاری دید، بلافاصله با پزشک معالج تماس بگیرید.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

- انسولین و محرک‌های ترشح انسولین، القاکننده‌های آنزیم CYP3A4 (کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، پریمیدون، ریفامپین و میتوتان)، سولفونیل اوره‌ها (کلروپروپامید، گلی بن کلامید)، گیاه علف چای.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی‌شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فراورده نمی‌باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می‌تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- بزرگسالان: روزانه یک قرص ۵ میلی گرمی
- به دلیل عدم تایید سلامت و کارایی این دارو در افراد کمتر از ۱۸ سال، از مصرف آن در این افراد خودداری شود.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا

داروساز مشورت نمایید.

افزایش اسید اوره، درد مفاصل، کمر درد، واکنش‌های حساسیتی شدید، لرزش، تعریق و تاری دید، کهیر، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، خس خس سینه و تنگی نفس، تورم صورت، لب‌ها، زبان، گلو و بینی، سردرد، عفونت مجاری ادراری، یبوست، اسهال، دردهای شکمی همراه با تهوع، تاول‌های پوستی، افزایش سطح آمیلاز و لیپاز در خون

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان علامتی به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

* اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.