



- مانند سایر داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی این دارو ممکن است مورد سوء استفاده مصرف قرار بگیرد.
- از کمتر و یا بیشتر کردن مقدار دارویی که پزشک تجویز نموده، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به پرگابالین یا هریک از اجزای دارو

مصرف در دوران بارداری

از نظر FDA این دارو جزء گروه C می باشد. از این دارو در دوران بارداری تنها زمانی که فواید دارو برای مادر بیش از مضرات آن برای جنین باشد می توان استفاده کرد.

مصرف در دوران شیردهی

پزشک باید با توجه به اهمیت دارو برای مادر، یا شیردهی را قطع نماید و یا اینکه مصرف دارو در مادر را متوقف نماید.

هشدارها و موارد احتیاط

- در بیماران با نارسایی قلبی، با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران با نارسایی کلیوی، تنظیم دوز دارو باید انجام گیرد.
- سلامت و اثربخشی این دارو در کودکان و نوزادان به اثبات نرسیده است.
- بیماران باید در طول درمان، از لحاظ تغییرات روحی و روانی، زیر نظر پزشک معالج باشند.
- به بیمار باید درمورد احتمال وقوع اختلالات بینایی اطلاع کافی ارائه گردد و در صورت تشخیص اختلالات بینایی مثل تاری دید، بیمار باید به پزشک معالج اطلاع دهد.
- در طول درمان آقایان، در صورت تمایل به بارداری همسر، باید با پزشک معالج مشورت شود.

تداخلات دارویی

- داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی و الکل
- داروهای آنتی دیابت
- داروهای ضد صرع و تشنج

لایرولیکس در سه قدرت اثر عرضه می گردد:

- کپسول حاوی ۷۵ میلی گرم پرگابالین
- کپسول حاوی ۱۰۰ میلی گرم پرگابالین
- کپسول حاوی ۱۵۰ میلی گرم پرگابالین

دسته دارویی

ضد درد عصبی - ضد تشنج

موارد مصرف

- کاهش دردهای عصبی ناشی از بیماری های هرپسی
- کاهش دردهای عصبی ناشی از نوروپاتی محیطی
- به عنوان داروی کمکی در درمان صرع پارشیال در بزرگسالان

راهنمایی های عمومی برای بیمار

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
- دارو را می توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز به محض یادآوری دارو را مصرف نمایید. اگر زمان مصرف دوز بعدی نزدیک است از مصرف دارو و همچنین دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.
- در طول درمان، بیمار باید توسط پزشک معالج تحت کنترل علائم و عوارض دارو قرار داشته باشد.
- این دارو ممکن است باعث دوبینی، تاری دید، گیجی، سرگیجه و خواب آلودگی شود لذا در طول درمان از رانندگی و کار کردن با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- قطع مصرف دارو باید تحت نظر پزشک و به تدریج در مدت زمان حداقل یک هفته انجام شود.
- این دارو ممکن است باعث افزایش وزن و ادم گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:
دوز معمول دارو با توجه به نوع بیماری و شرایط بیمار، ۵۰ الی ۱۵۰ میلی‌گرم سه بار در روز می‌باشد که می‌تواند زیر نظر پزشک بعد از یک هفته افزایش یابد.

- کاهش جذب: تخلیه معده به وسیله داروهای تهوع آور و یا لاواژ معده می‌تواند باعث کاهش جذب شود. البته باید راه تنفسی بیمار کاملاً باز نگه داشته شود.
- مونیتورینگ: علائم حیاتی و وضعیت پزشکی بیمار باید مرتباً چک شود.

شرایط نگهداری

- دارو را درون جعبه، دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

* **اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است.** بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

عوارض جانبی

واکنش‌های حساسیتی از جمله آنژیوادم، تاری دید و اختلالات بینایی، کاهش میزان ادرار، ادم اندام‌ها، افزایش وزن، گیجی، سرخوشی، خشکی دهان، یبوست و سردرد، کاهش حافظه، اختلال در راه رفتن یا صحبت کردن.

مسمومیت

- برای درمان مسمومیت ناشی از از پرگابالین آنتی دوت خاصی موجود نمی‌باشد. درمان علامتی و حمایتی است.