



تیلیکارد®

تلمیزارتان

هر قرص حاوی ۲۰ میلی گرم ، ۴۰ میلی گرم و یا ۸۰ میلی گرم تلمیزارتان می باشد.

دسته دارویی

قلبی عروقی/کاهش دهنده فشار خون

موارد مصرف

-درمان فشار خون بالا در بزرگسالان به تنهایی یا همراه با سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون
- کاهش خطر ابتلای به بیماری های قلبی عروقی شامل حمله قلبی، سکته مغزی در بیماران قلبی عروقی بالاتر از ۵۵ سال و بیماران مبتلا به دیابت پر خطر

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- دارو را می توانید همراه با غذا و یا با فاصله از غذا همراه با یک لیوان آب مصرف کنید.
-درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر ندهد و یا مصرف دارو را قطع نکنید.

-در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.

-مصرف این فراورده ممکن است سبب بروز سرگیجه شود. در طی مصرف این دارو در هنگام رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت دارند احتیاط نمایید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به تلمیزارتان یا هر یک از اجزای سازنده دارو
- اختلالات انسدادی صفراوی و اختلالات کبدی از جمله کلستاز

مصرف در دوران بارداری

- مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در دوران شیردهی

- بدلیل احتمال ترشح دارو در شیر مادر، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط

- مصرف همزمان قرص تلمیزارتان با هرگونه داروی کاهش دهنده فشار خون باید تحت نظر پزشک معالج انجام شود.

- در حین مصرف این دارو بطور مرتب فشار خون بیمار، عملکرد کلیه ها و سطح الکترولیت ها باید کنترل شوند و پزشک بسته به میزان پاسخ بیمار، دوز دارو را کاهش یا افزایش می دهد.

- این دارو می تواند موجب بروز افت فشار خون به ویژه در بیمارانی که داروهای مدر مصرف می کنند شود. در صورت بروز افت فشار خون، از پزشک جهت تغییر دوز مصرفی و توصیه های لازم سوال نمایید.

- مصرف این دارو می تواند موجب افزایش سطح پتاسیم در خون شود، به ویژه در بیماران با سابقه نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی و افرادی که داروهایی مصرف می کنند که می تواند باعث افزایش پتاسیم در خون شود (مانند مکمل های حاوی پتاسیم یا داروهای مدر). طی دوره مصرف این دارو بصورت مرتب آزمایش لازم جهت بررسی سطح الکترولیت های بدن انجام شود.

- مصرف این دارو در افراد با سطح بالای آلدوسترون (عدم تعادل سطح سدیم، پتاسیم و آب در بدن) توصیه نمی شود .

- مصرف این دارو همچون سایر آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین و مهار کننده ACE باید در بیماران با اختلالات عملکرد کلیوی و بیماران با نارسایی احتقانی قلب با احتیاط لازم صورت گیرد زیرا ممکن است سبب بروز نارسایی حاد کلیوی یا مرگ شود .

- مصرف این دارو در افراد دیابتی ممکن است سبب افت قند خون شود. بنابراین توصیه می شود قندخون این بیماران بصورت مرتب بررسی گردد .

- کارایی و ایمنی این دارو در کودکان ثابت نشده است.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها قبل از مصرف این دارو حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

-این فرآورده با داروهای زیر تداخل اثر دارد:

-مصرف همزمان این دارو با داروهای حاوی Aliskiren در افراد دیابتی یا بیماران با نارسایی کلیوی ممنوع است.

- مصرف همزمان این دارو با داروهای مهار کننده ACE (از جمله کاپتوپریل، رامیپریل، ...) توصیه نمی شود.

- داروهای Digoxin ، لیتیم، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (از جمله آسپرین، ایبوپروفن، ...) و داروهای مهارکننده سیکلواکسیژناز ۲ (سلکوکسیب، ملوکسیکام، ...)، کورتیکواستروئیدها (بصورت تزریقی)، داروهای افزایش دهنده سطح پتاسیم خون، داروهای مدر، آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین و سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون بر غلظت اثر داروی تلمیزاتان اثرگذارند.

توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل

محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک بر اساس نیاز بیمار تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- جهت کاهش فشار خون در بزرگسالان: روزانه یک قرص ۴۰ میلی گرمی بصورت یکبار در روز

- جهت کاهش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی: روزانه یک قرص ۸۰ میلی گرمی بصورت یکبار در روز
- در بیماران با نارسایی کیدی و یا نارسای کلیوی، تنظیم دوز دارو، توسط پزشک معالج انجام می گیرد.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

اختلالات کلیوی همراه با مصرف فرآورده رامیپریل، سینوزیت، کمر درد، عفونت مجاری تنفسی فوقانی، درد قفسه سینه، اسهال، اختلالات کبدی، افت فشار خون، عفونت مجاری ادراری، افزایش سطح پتاسیم خون، سرفه، درد شکمی، نفخ، استفراغ، انقباض عضلانی، احساس ضعف

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس و دید کودکان قرار دهید.

❖ مهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران



Darou Darman Pars