

مصرف در دوران شیردهی
اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد، با این وجود از آنجا که ممکن است مصرف این فراورده موجب کاهش جذب ویتامین ها شود مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

بایولا® در یک قدرت اثر عرضه می گردد:
قرص روکش دار حاوی ۸۰۰ میلی گرم سولامر کرینات

دسته دارویی
کلیوی- فسفات بایندر (متصل شونده به فسفات)

موارد مصرف

- این فراورده جهت کاهش میزان فسفات خون در بیماران کلیوی که تحت دیالیز صفاقی یا همودیالیز هستند و یا بیماران کلیوی که دیالیز نمی شود و غلظت سرمی فسفات آنها بیشتر از ۱/۷۸ میلی مول بر لیتر باشد مصرف می شود.

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، میزان وعده بعدی دارو را دو برابر نکنید و دوز بعدی را در زمان مشخص خود مصرف کنید.
- قرص را به صورت کامل بلعید. از خرد کردن و جویدن قرص خودداری نمایید.
- دارو را همراه غذا میل کنید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به هر یک از اجزای این فراورده
- انسداد روده

مصرف در دوران بارداری

در مطالعات انجام شده بر روی حیواناتی که سولامر کرینات مصرف می کنند عوارض جانبی گزارش شده است. همچنین ممکن است مصرف این فراورده موجب کاهش جذب ویتامین ها شود. تنها در صورتیکه منابع مصرف دارو مهم تر از مضرات احتمالی آن برای جنین باشد آن را مصرف کنید.

هشدارها و موارد احتیاط

- مصرف دارو در موارد ذیل باید با احتیاط صورت گیرد:
- انسداد روده و سوراخ شدن مجاری گوارشی با مصرف این دارو گزارش شده است. این فراورده در بیماران با اختلالات گوارشی مانند یبوست شدید، اختلالات بلع و جراحی های بزرگ گوارشی، با احتیاط مصرف شود.
- ممکن است مصرف این فراورده موجب کاهش جذب ویتامین های D، E، K و فولیک اسید شود.
- جهت مصرف دارو در بیمارانی که مشکل بلع دارند، فرم سوسپانسیون دارو پیشنهاد می گردد.

تداخلات دارویی

در صورتی که داروی دیگری مصرف می کنید باید یک ساعت قبل یا سه ساعت پس از مصرف سولامر کرینات آن را مصرف نمایید. در صورت استفاده از سایر داروها از جمله داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع نمایید. سیپروفلوکساسین، کلسیتریول، کولیک اسید، سیکلوسپورین، لووتیروکسین، مایکوفنلات موفتیل، آنتی بیوتیک های کینولون مانند لووفلوکساسین، تاکرولیموس، امپرازول، پنتوپرازول و لنزوپرازول، داروهای قلبی عروقی و داروهای صرع.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف همزمان آن با این دارو نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک بر اساس نیاز بیمار تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است: بزرگسال: دوز آغازین ۱ تا ۲ قرص سه بار در روز می باشد، تا زمانیکه غلظت سرمی فسفات تنظیم گردد. کنترل میزان فسفات خون در فواصل دو الی چهار هفته انجام می گردد.

با توجه به شرایط بیمار و میزان فسفات خون میزان مصرف دارو تا ۱۵ عدد در دوزهای منقسم (سه بار در روز) قابل افزایش می باشد.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. یبوست، اسهال، تهوع و استفراغ، سوء هاضمه، نفخ، اختلال و ناراحتی های گوارشی، انسداد گوارشی، التهاب صفاتی، واکنش های پوستی

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی تعبیه شده جهت محافظت از نور و رطوبت، نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

*اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.