



- این دارو در دیابت نوع ۱ و کتواسیدوز دیابتی کارایی نداشته و مصرف آن مناسب نمی باشد.
- در بیماران با نارسایی کلیوی و دیالیزی

مصرف در دوران بارداری

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط

- قطع درمان با امپا گلیفلوزین در بیمارانی که برای جراحی های مهم و یا بیماری های حاد در بیمارستان بستری می شوند تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود، الزامی می باشد.

- در صورت بروز علائم کتواسیدوز دیابتی، مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک معالج اطلاع دهید. علائم کتواسیدوز دیابتی شامل: تکرر ادرار، تشنگی شدید، بوی میوه ای دهان، خستگی و گیجی، تنفس سریع، خشکی دهان، درد شکم و تهوع

- عملکرد کلیه ها به ویژه در افراد با سابقه بیماری کلیوی، قبل از شروع درمان و به طور مرتب در مدت زمان مصرف دارو، باید مورد بررسی قرار گیرد.

- افت فشار خون ممکن است پس از شروع مصرف امپا گلیفلوزین مشاهده شود، به ویژه در بیماران با سابقه اختلال کلیوی، افراد مسن بالای ۷۵ سال و بیمارانی که داروهای مدر مصرف می نمایند. نشانه های افت فشار خون (ضعف، سرگیجه) پس از شروع درمان باید کنترل شود.

- مصرف این دارو همراه با انسولین و یا دیگر داروهای کاهش دهنده قند خون می تواند باعث کاهش بیش از حد سطح قند خون شود (هایپوگلیسمی). در صورت بروز علائمی سردرد، گرسنگی، ضعف، لرزش، گیجی و تهوع، به پزشک مراجعه نمایید و از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید.

- امپا گلیفلوزین ممکن است سبب بروز عفونت مجاری ادراری و یا بروز عفونت های قارچی دستگاه

قرص گلا پسانو® در دو قدرت اثر عرضه می گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۱۰ میلی گرم امپا گلیفلوزین
- قرص روکش دار حاوی ۲۵ میلی گرم امپا گلیفلوزین

دسته دارویی

کاهش دهنده قند خون

موارد مصرف

این دارو در موارد زیر مصرف می شود:

- دیابت نوع ۲، در کنار ورزش و رژیم غذایی
- برای کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع ۲ و بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- دارو را می توانید همراه با غذا و یا با فاصله از غذا مصرف کنید.

- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید. بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر نداده و یا مصرف دارو را قطع نکنید.

- به توصیه ی پزشک در مورد ورزش و رژیم غذایی توجه نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن را میل کنید و اگر تقریباً زمان مصرف بعدی نزدیک شده، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف

- سابقه حساسیت شدید به امپا گلیفلوزین و یا هر یک از اجزای دارو

این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

افت قند خون، عفونت مجاری ادراری، افزایش چربی خون، تشنگی، تهوع، تکرر ادرار، افزایش کلسترول و هماتوکریت، عفونت قارچی دستگاه تناسلی در زنان و مردان.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان علامتی به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

* اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

تناسلی در بیماران با سابقه این عفونت‌ها شود.
- در صورت بروز علائمی همچون درد، حساسیت، اریتم یا تورم در ناحیه دستگاه تناسلی یا پرینه، همراه با تب یا کسالت (علائم فاسیای نکروز شونده پرینه) بلافاصله به پزشک معالج اطلاع دهید.
- در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی از جمله تورم گلو، لب‌ها و یا زبان، خس خس سینه و یا واکنش‌های حساسیتی پوست، مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک تماس بگیرید.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

این دارو با داروهای مدر (افزایش دهنده ادرار)، انسولین و محرک‌های ترشح انسولین تداخل اثر دارد.

توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی‌شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی‌باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می‌تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

بزرگسالان بالای ۱۸ سال: روزانه یک عدد قرص ۱۰ میلی گرم میل شود که بر اساس تحمل بیمار دوز دارو می‌تواند تا ۲۵ میلی گرم در روز افزایش یابد.
- مصرف دارو در افراد مسن بالای ۸۵ سال توصیه نمی‌شود.

کودکان: ایمنی و کارایی این دارو در کودکان ثابت نشده است.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه