



نوشیدن الکل
- در صورتی که باردار هستید یا قصد باردار شدن
دارید یا در دوران شیردهی هستید، پزشک
خود را مطلع نمایید.

موارد منع مصرف

- حساسیت به رزمیتیروم یا هر یک از اجزای سازنده
دارو

مصرف در دوران بارداری

مطالعات مربوط به مصرف این دارو در دوران بارداری
کافی نبوده و مصرف در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در دوران شیردهی

با توجه به عدم اطلاعات کافی در مورد ترشح دارو
در شیر مادر و تاثیر دارو بر شیرخوار، لازم است
درباره ادامه شیردهی و مصرف دارو با پزشک معالج
خود مشورت نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط

- ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان و افراد زیر
۱۸ سال مشخص نیست. مصرف این دارو در افراد
زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.
- طی درمان با این دارو، بیمار باید از نظر ارزیابی
آزمایشات کبدی و واکنش های جانبی مرتبط با
کیسه صفرا و کبد (مانند هپاتوتوکسیسیته با علائم:
خستگی، حالت تهوع، استفراغ، درد در ناحیه فوقانی
سمت راست شکم، زردی، تب، بثورات پوستی و
یا ائوزینوفیلیا بالای ۵٪) تحت نظر باشد.
- با توجه به افزایش غلظت استاتین ها (داروهای
کاهش دهنده چربی مانند: آتورواستاتین،
سیمواستاتین، رزاواستاتین)، در صورت مصرف همزمان
با این دارو، تنظیم دوز استاتین توصیه می شود و
بیمار باید از نظر عوارض جانبی وابسته به استاتین ها

رسمیرا[®] در سه قدرت اثر عرضه می گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۶۰ میلی گرم رزمیتیروم
- قرص روکش دار حاوی ۸۰ میلی گرم رزمیتیروم
- قرص روکش دار حاوی ۱۰۰ میلی گرم رزمیتیروم

دسته دارویی

آگونیست انتخابی گیرنده هورمون تیروئید-بتا (THR-β)
در کبد

موارد مصرف

- درمان استئاتو هپاتیت مرتبط با اختلال عملکرد
متابولیک (MASH) (یا استئاتو هپاتیت غیرالکلی
NASH) همراه با فیروز متوسط تا شدید (درجه
۲ یا ۳) در بزرگسالان در کنار اصلاح سبک زندگی
(ورزش و رژیم غذایی).

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است،
لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به
دیگران جدا خودداری نمایید.

- قبل از مصرف، برگه راهنمای دارو را
مطالعه نمایید.

- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید.
بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر نداده و یا
مصرف دارو را قطع نکنید.

- قبل از مصرف این دارو پزشک خود را از تمام
شرایط پزشکی خود مطلع کنید، به ویژه در
صورت:

- مشکلات کبدی غیر از MASH (مانند عفونت های
کبدی و..)
- مشکلات کیسه صفرا شامل سنگ های صفراوی
- نوشیدن الکل یا آسیب های کبدی به دلیل

(میوپاتی ، رابدومیولیز) و ارزیابی آزمایشات کبدی تحت نظر باشد.

- از مصرف این دارو در بیماران مبتلا به سیروز جبران نشده (decompensated cirrhosis) اجتناب شود.

تداخلات دارویی

- در صورت استفاده از سایر داروها حتی داروهای بدون نسخه، ویتامین‌ها و مکمل‌های گیاهی حتماً پزشک خود را مطلع نمایید .

- غلظت رزمیتروم در صورت مصرف همزمان با داروهای زیر افزایش می یابد:

Clopidogrel (کاهش انعقاد خون)، Deferasirox

(حذف آهن اضافی از بدن)، Gemfibrozil (کاهش

چربی‌های خون)، Teriflunomide (درمان MS)،

Cyclosporin (مهارکننده سیستم ایمنی)

- غلظت داروهای زیر در صورت مصرف همزمان با ررمیتروم افزایش می یابد:

استاتین‌ها (مانند آتورواستاتین، سیمواستاتین،

رزواستاتین)، Pioglitazone

توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض شایع :

• اسهال، حالت تهوع، خارش، درد شکم، استفراغ، گیجی، یبوست.

عوارض جدی اما با شیوع کمتر:

• آسیب به کبد مانند هیپاتوتوکسیسیته (با علائم: خستگی، حالت تهوع، استفراغ، درد در ناحیه فوقانی سمت راست شکم، زردی، تب، بثورات پوستی)

• مشکلات کیسه صفرا مانند التهاب یا سنگ های کیسه صفرا (با علائم: تهوع و استفراغ، تب، دردهای شکمی شدید).

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

* اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

تهران - ایران

