



ریگارو®
ریمچپانت

تأثیر قابل توجه بر توانایی رانندگی یا کار با ماشین آلات نمی شود.
مصرف این دارو در افراد زیر ۱۸ سال به دلیل عدم وجود مطالعات بالینی کافی در این گروه سنی توصیه نمی شود.

ریگارو® در یک قدرت اثر عرضه می گردد:
قرص بازشونده در دهان حاوی ۷۵ میلی گرم ریمچپانت (به فرم سولفات)

دسته دارویی

داروهای مغز و اعصاب / ضد میگرن

موارد مصرف

- درمان فوری حملات میگرن با یا بدون اورا (علائم هشداردهنده عصبی) در بزرگسالان
- پیشگیری و کاهش تعداد دفعات عود میگرن های اپیزودیک (دوره‌ای) بزرگسالان

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام داده و بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر ندهید.
- قبل از مصرف این دارو، پزشک خود را از تمام شرایط پزشکی خود مطلع کنید، به ویژه اگر:
 - فشار خون بالا و یا مشکلات گردش خون در انگشتان دست یا پا دارید
 - مشکلات کبدی یا کلیوی دارید
 - باردار هستید، قصد بارداری دارید و یا در دوران شیردهی هستید

- در صورت بروز حساسیت یا واکنش آلرژیک (مانند مشکل تنفسی یا راش شدید) دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک اطلاع دهید.

- در صورت مصرف دارو برای پیشگیری از حملات میگرن، اگر یک نوبت مصرف را فراموش کردید، نوبت بعدی را در زمان مقرر مصرف کنید و هرگز دو دوز را همزمان استفاده نکنید.

- مصرف این دارو، موجب خواب آلودگی و یا

موارد منع مصرف

- اگر سابقه‌ی حساسیت به ریگارو® یا هر یک از ترکیبات این قرص را دارید، از مصرف این دارو خودداری کنید.

- ابتلا به نارسایی کبدی شدید (Child-Pugh C).
در صورت عدم اطمینان، پیش از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری

مطالعات مربوط به مصرف در دوران بارداری کافی نبوده و مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در دوران شیردهی

با توجه به ترشح مقدار کمی از دارو در شیر مادر و کافی نبودن مطالعات موجود جهت ارزیابی تأثیر دارو بر شیرخواران، لازم است درباره ادامه شیردهی و مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.

هشدارها و موارد احتیاط

- جهت پیشگیری از بروز تداخل دارویی، پیش از مصرف دارو، فهرست تمام داروها، ویتامین‌ها و مکمل‌های گیاهی خود را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.
- واکنش‌های آلرژیک حین مصرف ریگارو®، به ندرت مشاهده شده است؛ در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو، مشکل در تنفس، راش پوستی یا خارش شدید، فوراً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، حتماً پزشک خود را مطلع کنید؛ زیرا ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو باشد.

تداخلات دارویی

پیش از شروع مصرف این دارو، در صورت استفاده از هر داروی دیگر (شامل داروهای نسخه ای، بدون نسخه یا گیاهی) حتماً پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید.

• داروهایی که نباید هم‌زمان مصرف شوند (خطر افزایش یا کاهش شدید اثر دارو وجود دارد):

- داروهای ضدقارچ یا ضدباکتری قوی
- مثل ایتراکونازول و کلاریترومایسین
- داروهای ضد ویروس مثل ریتوناویر
- داروهای ضد صرع مثل فنوباربیتال و فنی توئین
- داروهایی مثل ریفامپیسین، بوستتان و مدافینیل
- گیاهان دارویی مثل سنت جانز وورت (علف چای)

• داروهایی که باید بین مصرف آن‌ها و ریمجپانت حداقل ۴۸ ساعت فاصله باشد (زیاد شدن سطح دارو در بدن):

- برخی داروهای ضدقارچ یا ضدباکتری
 - مثل فلوکونازول، اریترومایسین و آزیترومایسین
 - داروهای قلبی مثل دیلتیازم، کینیدین، وراپامیل و رانولازین
 - داروهایی مثل سیکلوسپورین
- مصرف هم‌زمان با این داروها می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قابل توجه اثر ریمجپانت شود. توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی‌شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم‌زمان آن با این فراورده نمی‌باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می‌تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک بر اساس نیاز بیمار تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- جهت درمان میگرن حاد، یک قرص (۷۵ میلی

گرم) در روز به محض شروع سردرد

- جهت پیشگیری از میگرن اپیزودیک، یک قرص (۷۵ میلی گرم) در روز به صورت یک روز در میان

- از مصرف بیش از یک قرص در ۲۴ ساعت خودداری کنید.

- مطالعات کافی جهت بررسی ایمنی مصرف بیش از ۱۸ دوز در یک دوره ۳۰ روزه، وجود ندارد.

- جهت مصرف ریگاردو®، با دستان خشک و به آرامی، قرص را از بسته بندی خارج و بلافاصله رو یا زیر زبان قرار دهید. قرص با کمک بزاق حل شده و با قورت دادن بزاق به معده منتقل می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید پس از مصرف دارو، آب بنوشید.

- مصرف این قرص بدون توجه به وعده‌های غذایی بوده و نیاز به مصرف آب یا نوشیدنی دیگر ندارد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- شایع‌ترین عارضه این دارو در صورت مصرف جهت حملات حاد میگرن، تهوع می‌باشد.

- شایع‌ترین عوارض این دارو در صورت مصرف جهت پیشگیری از حملات میگرن، مشکلات گوارشی مانند تهوع، دردهای شکمی و یا احساس پر بودن معده می‌باشند.

- مصرف ریمجپانت ممکن است باعث افزایش فشار خون و یا ایجاد مشکل در گردش خون و تغییر رنگ انگشتان دست یا پا (عارضه رینود یا Raynaud's phenomenon) شود؛ به محض احساس علائم، به پزشک مراجعه کنید.

در صورت مشاهده عوارض دیگری حین مصرف این دارو، عارضه را به پزشک و یا داروساز خود گزارش داده و با آن‌ها مشورت نمایید.

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران



Darou Darman Pars