

بنابراین در صورت بروز این عوارض، از رانندگی و استفاده از ماشین آلات خودداری کنید.

زادورل® ۱/۵

اینداپاماید



موارد منع مصرف

- سابقه حساسیت شدید به اینداپاماید و یا هر یک از اجزای دارو
- بیماری کلیوی شدید
- بیماری کبدی شدید یا انسفالوپاتی کبدی
- سطح پتاسیم پایین خون

مصرف در دوران بارداری

مصرف این فراورده در دوران بارداری مجاز نمی‌باشد. در صورتیکه که در حین مصرف دارو مطلع شدید که باردار هستید، باید به پزشک معالج اطلاع داده و از درمان جایگزین استفاده کنید.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. بنابراین مصرف این دارو در دوره شیردهی مجاز نمی‌باشد.

هشدارها و موارد احتیاط

- در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:
 - سابقه نارسایی کبدی
 - سابقه نارسایی کلیوی
 - ابتلا به دیابت، اینداپاماید می‌تواند باعث افزایش قند خون شود، در طول درمان، میزان قند خون را چک نمایید.
 - ابتلا به نقرس، در طول درمان میزان اسید اوریک خون را چک نمایید
 - در صورت نیاز به آزمایش برای بررسی میزان عملکرد غده پاراتیروئید
 - سابقه حساسیت به نور (photosensitive)
 - ممکن است نیاز به بررسی پزشکی سطح سدیم یا پتاسیم یا کلسیم خون باشد. در صورت بروز هر گونه سوالی در این مورد با پزشک مشورت نمایید.

زادورل® در قدرت اثر زیر عرضه می‌گردد:

- قرص پیوسته‌رهش حاوی ۱۰۵ میلی‌گرم اینداپاماید

دسته دارویی

مدر/کاهش دهنده فشار خون

موارد مصرف

این دارو در درمان فشار خون بالا در بیماران مصرف می‌شود. این دارو با افزایش حجم عروق خونی و راحت تر کردن مسیر عبور خون باعث کاهش فشار خون می‌گردد. این دارو همچنین در کاهش ورم ناشی از نارسایی قلبی مصرف می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
- قرص را به صورت کامل بلعیده و از نصف کردن و یا خرد کردن آن بپرهیزید.
- دارو را می‌توانید همراه و یا با فاصله از غذا مصرف نمایید.
- درمان را زیر نظر پزشک معالج انجام دهید و بدون نظر پزشک میزان دارو را تغییر ندهید و یا مصرف دارو را قطع نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، وعده بعدی را در زمان مشخص خود مصرف نمایید و از دو برابر کردن وعده بعدی خودداری نمایید.
- مصرف این دارو بدلیل اثر کاهش دهنده فشار خون، بخصوص در شروع درمان، ممکن است سبب بروز عوارضی همچون سرگیجه و خستگی شود.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

- از مصرف این دارو بصورت همزمان با لیتیوم (که در درمان افسردگی استفاده می شود) بدلیل خطر افزایش سطح لیتیوم خون خودداری نمایید.
در صورت مصرف همزمان با فراورده های زیر احتیاط نمایید:

داروهای مورد استفاده در مشکلات ریتم قلبی (مانند کینیدین، هیدروکینیدین، دیزوپیرامید، آمیودارون، سوتالول، دیجیتالیس)، داروهای مورد استفاده در مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، شیذوفرنیا... (مانند داروهای ضد افسردگی تری سیکلیک، داروهای آنتی سایکوتیک، نورولپتیک ها)، موکسی فلوکساسین، اریترومایسین تزریقی، پنتامیدین، میزولاستین، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی برای تسکین درد (مانند ایبوپروفن) یا دوزهای بالای استیل سالیسیلیک اسید، مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE)، آمفوتریسین B تزریقی، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، میفپریستون، ملین های محرک، باکلوفن، آلپورینول، داروهای ادرار آور پتاسیم (آمیلوراید، اسپرونولاکتون، تریامترن)، متفورمین، ماده حاجب یددار (که برای آزمایش های مربوط به اشعه X استفاده می شود)، قرص کلسیم یا سایر مکمل های کلسیم، سیکلوسپورین، تاکرولیموس یا سایر داروهایی که برای کاهش سیستم ایمنی بدن استفاده می شود، تتراکوزاکتاید، مکمل های حاوی ویتامین D

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فراورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- میزان مصرف دارو، روزانه یک قرص و ترجیحاً صبح ها می باشد. در صورت لزوم مقدار دارو توسط پزشک افزایش می یابد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت بروز هرگونه علامت حساسیت به دارو، از جمله ورم گلو و زبان، واکنش های پوستی، تنگی نفس و ... به پزشک معالج مراجعه نمایید.
عوارض دارو می تواند شامل: تهوع، خستگی، سردرد، سرگیجه، یبوست، ضعف، گرفتگی عضلات، اضطراب و خشکی دهان باشد.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان علامتی به مراکز درمانی مراجعه نمایید. مصرف بیش از مقدار توصیه شده سبب بروز تهوع و استفراغ، افت فشار خون، کرامپ، سرگیجه، خواب آلودگی، گیجی می شود.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

* **اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.**

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران



Darou Darman Pars