

زایولید®

لینزولید



- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن را میل کنید و اگر تقریباً زمان مصرف بعدی نزدیک شده، آن وعده را مصرف نکرده و میزان وعده بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف

- حساسیت شدید به دارو و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو
- مصرف همزمان با داروهای ضد افسردگی MAOI (مانند فنلزین، ایزوکربوکسازید، ...) و تا دو هفته پس از قطع مصرف این فرآورده ها

مصرف در دوران بارداری

مطالعات کافی در زنان باردار انجام نشده است. بهتر است از مصرف این فرآورده خودداری شود مگر با توصیه پزشک. بنابراین در صورت بارداری یا تصمیم به بارداری شدن پزشک خود را مطلع نمایید.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می شود. بنابراین مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط

- این دارو فقط برای عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت می باشد و برای عفونت با باکتری های گرم منفی کارایی ندارد. ایمنی و کارایی این دارو برای مصرف بیش از ۲۸ روز ارزیابی نشده است. همچنین جهت جلوگیری از مقاومت دارویی و حفظ کارایی دارو، بهتر است از این دارو فقط در موارد تجویز شده توسط پزشک و ذکر شده در برگه راهنمای دارو مصرف شود.
- در صورت مصرف بیش از ۲۸ روز از این دارو و همچنین در صورت بروز علائمی همچون اختلال در دید، اختلال در تشخیص رنگ ها و تاری دید در طی دوره مصرف این دارو، وضعیت بینایی بیمار باید توسط پزشک کنترل شود.
- مواردی از بروز میلو ساپرشن (شامل کم خونی، کاهش گلبول های سفید، قرمز یا پلاکت خون، ...) با مصرف این دارو گزارش شده است. طی دوره مصرف این

زایولید® در یک قدرت اثر عرضه می گردد:

- قرص روکش دار حاوی ۶۰۰ میلی گرم لینزولید

دسته دارویی

آنتی بیوتیک

موارد مصرف

- درمان عفونت های پنومونی بیمارستانی (عفونت حاد ریه) ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس (مقاوم به متی سیلین) یا استرپتوکوک پنومونی، باکتریومی، برخی از عفونت های ساده و پیچیده پوستی و زیر پوستی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس (مقاوم به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژنز، عفونت پای دیابتی، عفونت های انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به ونکومایسین

راهنمایی های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- در طول درمان از مصرف حجم بالای غذاهای حاوی تیرامین مانند عصاره مخمر، عصاره دانه سویا و سویا سس، مشروبات الکلی به ویژه آبجو خودداری کنید زیرا موجب افزایش فشار خون می شود.
- در صورت بروز سردرد ضربان دار پس از خوردن و آشامیدن حتماً پزشک را مطلع نمایید.
- به علت احتمال تاری دید، در کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت و هوشیاری دارند احتیاط نمایید.
- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و دوز بعدی را دو برابر نکنید.

- افت سدیم و/یا سندروم SIADH در طی درمان با این دارو می تواند بروز نماید. در صورت بروز علائمی مانند گیجی، خواب آلودگی، ضعف عمومی و حتی نارسایی تنفسی و در صورت مصرف داروهای مدر پزشک خود را مطلع نمایید. طی درمان با این دارو سطح سرمی سدیم در افراد مسن باید بررسی گردد.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

- از مصرف همزمان با داروهای MAOI خودداری شود.
- در مصرف همزمان با داروهای سروتونرژیک، احتمال سندرم سروتونین افزایش می یابد.

- در صورت مصرف همزمان با داروهای ذیل، کنترل فشار خون و پایش بیمار توصیه می گردد:

داروهای سمپاتومیمتیک (پزودوافدرین)، داروهای منقبض کننده عروق (اپی نفرین، نوراپی نفرین)، دوپامینرژیک (دوپامین، دوپوتامین)

- مصرف این دارو در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون، احتمال هیپوگلیسمی را افزایش می دهند.

نکته: توجه شود عدم وجود نام دارو در لیست تداخلات به معنای عدم تداخل محسوب نمی شود و وجود یک دارو در این لیست به معنای ممنوع بودن مصرف هم زمان آن با این فرآورده نمی باشد. در بسیاری موارد پایش یا تغییراتی در دوز می تواند مانع تداخل گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:
با توجه به نوع عفونت، میزان مصرف دارو متغیر بوده و بدین شرح می باشد:

در بزرگسالان و کودکان بالای دوازده سال: ۴۰۰ الی ۶۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ الی ۲۸ روز.
در نوزادان و کودکان کمتر از دوازده سال: ۱۰ mg/kg هر ۸ الی ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ الی ۱۴ روز.

دارو به ویژه مصرف بیش از ۲ هفته و در بیماران نارسایی شدید کبدی و کلیوی و عفونت های مزمن، یا در صورت مصرف داروهای سرکوب کننده مغز استخوان، پایش بیمار جهت شمارش سلول های خونی توصیه می گردد.

- مواردی از ابتدا به سندروم سروتونین در مصرف همزمان با داروهای محرک سروتونین گزارش شده است. بهتر است در صورت ابتلا به سندروم کارسینوئید یا مصرف داروهای افزایش دهنده سطح سروتونین شامل داروهای ضد افسردگی، بوپروپیون، بوسپیرون، تریپتان ها، داروهای مخدر مانند مپریدین، از مصرف همزمان این دارو خودداری نمایید.

- این دارو در درمان عفونت های ناشی از استفاده از کاتتر کاربرد ندارد.

- مانند تمامی داروهای آنتی بیوتیک این دارو نیز می تواند موجب بروز اسهال با شدت های مختلف شود. این عارضه می تواند تا دو ماه پس از قطع مصرف این دارو نیز مشاهده شود. در صورت وجود اسهال آبکی یا خونی فوراً به پزشک معالج مراجعه نمایید و از مصرف خودسرانه داروهای ضد اسهال خودداری نمایید.

- مصرف این دارو در بیماران با فشار خون بالا، تشنج، پرکاری تیروئید و فئوکروموسیتوما باید با احتیاط صورت گیرد و در صورت مصرف داروهایی مانند سودوافدرین، اپی نفرین، نوراپی نفرین، دوپامین و دوپوتامین بهتر است فشار خون بیمار بصورت مرتب بررسی گردد.

- مواردی از بروز لاکتیک اسیدوز با مصرف این دارو گزارش شده است. در صورت بروز تهوع و استفراغ تکرار شونده حتماً به پزشک مراجعه نمایید.

- مواردی از رابدومیولیز با مصرف این فرآورده مشاهده شده است. در صورت بروز علائمی همچون درد و سفتی عضلات، خستگی و ادرار تیره پزشک را مطلع نمایید.

- مصرف این دارو در بیماران دیابتی که انسولین یا سایر داروهای کاهنده قند خون مصرف می نمایند می تواند سبب بروز افت قند خون (هیپوگلیسمی) شود. بهتر است به علائم افت قند خون در مدت مصرف این دارو توجه شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

میلو ساپرشن (کاهش تعداد پلاکت‌ها، کم خونی، کاهش گلبول‌های سفید)، اختلالات بینایی و تاری دید، یبوست، اسهال، تهوع، استفراغ، سردرد، بی‌خوابی، واکنش‌های پوستی، اختلال در نتایج آزمایشات بالینی، سندروم سروتونین، اسهال، لاکتیک اسیدوز، تشنج، رابدومیولیز، افزایش و افت فشار خون، افت سطح سدیم خون

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، جهت درمان علامتی به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

***اهم مطالب مرتبط با فرآورده، در برگه راهنما عنوان شده است. بیماران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرند.**

دارنده پروانه ساخت

شرکت دارو درمان پارس

ایران - تهران

